



Si apparition d'un ou plusieurs symptômes de réaction allergique...

Présence de 1 des 2 situations suivantes :

DÉFAILLANCE CIRCULATOIRE :

- Couleur pâle ou bleutée, pouls faible, perte de conscience, état de choc, arrêt cardiorespiratoire

DÉTRESSE RESPIRATOIRE :

- Grande difficulté à respirer, détresse importante (anxiété, sentiment de détresse, arrêt respiratoire)

Présence de 2 des 4 situations suivantes :

GRANDE FAIBLESSE :

- Couleur pâle, étourdissements, vertige

DIFFICULTÉ RESPIRATOIRE :

- Toux, respiration bruyante, serrement à la gorge, voix rauque, difficulté à avaler

URTICAIRE OU ANGIOEDÈME :

- Urticaire (démangeaisons, plaques rouges sur le corps, éruptions), angioedème (enflure des paupières et/ou du visage, des lèvres et de la langue)

SYMPTÔMES GASTRO-INTESTINAUX

- Nausées, douleur ou crampes abdominales, vomissements, diarrhée

Dans le doute, administrer l'auto-injecteur d'adrénaline au jeune

... Interventions d'urgence

Quoi faire :

1. Restez calme, asseoir ou coucher le jeune au sol, ne pas le déplacer, demander de l'aide et rester auprès du jeune.
2. Donnez immédiatement l'auto-injecteur d'adrénaline approprié et noter l'heure (voir le mode d'utilisation plus bas). L'injection peut être donnée à travers un vêtement.
3. Composez le **9-1-1**. Signaler qu'il s'agit d'une réaction allergique grave et demander l'ambulance (**obligatoire**).
4. **SI PAS D'AMÉLIORATION : répétez aux 5 minutes.**
5. Désignez une personne responsable pour accompagner le jeune à l'hôpital.
6. Informez l'ambulancier de l'heure et du nombre de doses administrées.
7. Avisez le parent ou tuteur.

Mode d'utilisation de l'EpiPen

	<ul style="list-style-type: none"> • Tenez l'auto-injecteur, le bout orange pointant vers le bas. • Enlever le bouchon de sécurité bleu en tirant tout droit. Ne le pliez pas, ne le tordez pas.
	<ul style="list-style-type: none"> • Placez le bout orange contre le milieu de la cuisse externe. • Poussez fermement l'auto-injecteur dans la cuisse jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». • Tenez l'auto-injecteur en place pendant 3 secondes complètes.

À la suite de l'injection, l'aiguille restera couverte afin d'éviter des piqûres accidentelles.

Mode d'utilisation de l'Allerject

	<p>Étape 1 Sortez l'appareil ALLERJECT de l'étui. Ne passez pas à la 2^e étape avant d'être prêt à utiliser ALLERJECT. Si vous n'êtes pas prêt à l'utiliser, remettez-le dans l'étui.</p>
	<p>Étape 2 Enlevez le dispositif de sécurité ROUGE en tirant fermement. Ne touchez pas la base noire de l'auto-injecteur (l'endroit où l'aiguille sort). Si une injection accidentelle survient, recherchez immédiatement des soins médicaux.</p>
	<p>Étape 3 Placez l'extrémité NOIRE sur le milieu de la cuisse EXTÉRIEURE, puis appuyez fermement et tenez l'appareil en place pendant cinq secondes. Vous entendrez alors un déclic et un sifflement lorsque vous appuyez ALLERJECT contre votre cuisse. Ne faites pas d'injection à un autre endroit. Si vous administrez ALLERJECT à un jeune enfant, tenez sa jambe fermement en place pendant la 3^e étape.</p>

***Si pas d'amélioration, répéter aux 5 minutes.**

Il n'y a pas de nombre de doses maximales. Si une 2^e dose est nécessaire, utiliser un 2^e auto-injecteur.