

PLAN D'URGENCE POUR ÉPILEPSIE AVEC DIASTAT

INTERVENTIONS RECOMMANDÉES

En présence de crise :	Si la crise dure plus de * minutes : *Selon le délai prévu au PI personnalisé
<ul style="list-style-type: none"> • Demeurer avec le jeune • Ne pas bouger la personne • Éloigner les curieux • Ne rien introduire dans la bouche • Ne pas retenir ses mouvements • Éviter qu'il se frappe la tête contre un objet qui pourrait le blesser • S'assurer qu'aucun obstacle ne gêne la respiration et tourner la tête de côté • Noter la durée de la crise 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Donner immédiatement le DIASTAT selon la technique. 2. Composer le 9-1-1-, transport par ambulance accompagné d'un adulte. 3. Parler doucement et rassurer le jeune. 4. Aviser les parents, la direction, l'infirmière et compléter le rapport d'observation de la crise. 5. Ne jamais laisser le jeune sans surveillance.



Appeler le 9-1-1- si :

Le jeune ne reprend pas conscience, sa respiration demeure difficile après la fin de la crise ou le pourtour de sa bouche est bleuté.

Une 2^e crise survient sans qu'il y ait retour à la normale après la première.

La confusion après la crise dure plus d'une heure.

La crise survient dans l'eau.

Le jeune est blessé ou est connu diabétique.

Le DIASTAT est administré.

Source : Alliance canadienne de l'épilepsie

ADMINISTRATION DU DIASTAT



1- Positionner sécuritairement



2- Retirer le couvercle et vérifier le dosage



3- Lubrifier l'embout



4- Visualiser l'anus



5- Introduire l'embout dans le rectum



6- Injecter le médicament en 3 secondes
et compter encore 3 secondes avant de retirer l'embout



7- Tenir les fesses fermées 3 secondes
Garder le jeune au repos