


PLAN D'URGENCE POUR ÉPILEPSIE

INTERVENTIONS RECOMMANDÉES	
En présence de crise :	Si la crise dure plus (+) de 5 minutes :
<ul style="list-style-type: none"> • Demeurer avec le jeune • Ne pas bouger la personne • Éloigner les curieux • Ne rien introduire dans la bouche • Ne pas retenir les mouvements • Éviter qu'il se frappe la tête contre un objet qui pourrait le blesser • S'assurer qu'aucun obstacle ne gêne la respiration et tourner la tête de côté • Noter la durée de la crise 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Composer le 9-1-1-, transport par ambulance accompagné d'un adulte. 2. Aviser les parents, la direction et l'infirmière et compléter le rapport d'observation de la crise. 3. Ne jamais laisser le jeune sans surveillance. 4. Parler doucement et rassurer le jeune.
	Si la crise dure moins (-) de 5 minutes :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Après la crise, rassurer et reconforter l'enfant. 2. Lui permettre de se reposer si nécessaire. 3. Ne jamais laisser le jeune sans surveillance. 4. Aviser les parents, la direction et l'infirmière et compléter le rapport d'observation de la crise. 5. Reprendre les activités régulières.
	Appeler le 9-1-1- si :
	<p>La crise (avec ou sans convulsion) dure plus de 5 minutes.</p> <p>Le jeune ne reprend pas conscience, sa respiration demeure difficile après la fin de la crise ou le pourtour de sa bouche est bleutée.</p> <p>Une 2^e crise survient sans qu'il y ait retour à la normale après la première.</p> <p>La confusion après la crise dure plus d'une heure.</p> <p>Il s'agit d'une première crise (non connu épileptique).</p> <p>La crise survient dans l'eau.</p> <p>Le jeune est blessé.</p> <p>Le jeune est connu diabétique.</p>