

GESTION DE L'HYPOGLYCÉMIE GRAVE AVEC LE GLUCAGON INTRANASAL

**JEUNE INCONSCIENT,
EN CONVULSION, INCAPABLE
D'AVALER, OU CONFUS**

Coucher le jeune sur le côté

Faire la glycémie si possible

Administrar immédiatement le
GLUCAGON intranasal si
une personne est habilitée à le faire

- Appeler le 911 afin de diriger vers l'urgence et indiquer aux ambulanciers l'heure de l'administration du médicament
- Aviser les parents

Après son réveil, donner un sucre à action rapide
puis une collation de glucides
s'il peut manger

Personnes formées pour
l'administration :

Où trouver le glucagon
intranasal :

Date d'expiration :

Ne jamais laisser seul un jeune en état d'hypoglycémie.

1

Préparation de la dose

- Tirez sur la bande rouge pour retirer la pellicule plastique.
- Ouvrez le couvercle et retirez le dispositif du tube.
- **Ne testez pas avant l'utilisation.**

Mise en garde: N'appuyez pas sur le piston avant d'être prêt à administrer la dose.



Gardez le tube scellé jusqu'au moment de l'emploi.



2

Administration:



- **Tenez le dispositif** entre les doigts et le pouce



1^{re} ÉTAPE

- **Insérez doucement la tige** dans l'une des narines jusqu'à ce que le ou les doigts touchent l'extérieur du nez



2^e ÉTAPE

- **Enfoncez complètement le piston** d'un geste ferme

La dose complète est administrée lorsque la **ligne verte** n'est plus visible

3

Après l'administration de la dose

Retirez la tige du nez et **jetez le dispositif et le tube utilisés.**

Appelez aussitôt les services d'urgence.

Si la personne en hypoglycémie est inconsciente, tournez-la sur le côté.

On doit immédiatement faire appel à une assistance médicale dans le cas d'une réaction allergique grave à BAQSIMI, telle que:

- éruption cutanée;
- difficulté à respirer;
- enflure du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge.

Les patients réagissent habituellement en l'espace de 15 minutes. **Incitez la personne à manger dès qu'elle est capable d'avaler sans danger.** Donnez-lui une source de sucre rapide, comme du jus ou une boisson gazeuse ordinaire. Donnez-lui ensuite à manger une source de sucre lent, comme des craquelins et du fromage, ou un sandwich à la viande.

Mise en garde: Remplacez sans tarder le dispositif BAQSIMI utilisé afin de disposer d'un nouveau dispositif BAQSIMI en cas de besoin.